

## Hallazgo de perdigones de caza en TAC de paciente en revisiones por cáncer de colon resecado


Kevin Doello<sup>1</sup>, Cristina Mesas<sup>2</sup>, Víctor Amezcua<sup>1</sup>, Juan Ramón Delgado<sup>1</sup>

1. Servicio de Oncología Médica, Hospital Virgen de las Nieves, Granada

2. Centro de Investigación Biomédica, Universidad de Granada, Granada

Autor de correspondencia: Kevin Doello

Correo electrónico: kevindoello@gmail.com



Paciente de 72 años operada de cáncer de colon T4N2M0 en 2010 y que recibió 12 ciclos de quimioterapia (FOLFOX) adyuvante. Sin evidencia de recaída desde entonces. En su último TAC de reevaluación no se observa evidencia de enfermedad tumoral ni a nivel locorregional ni a distancia. Sin embargo, en los cortes de TAC a nivel duodenal pueden apreciarse unas estructuras metálicas no presentes en estudios de TAC previos (círculos rojos) que se encuentran en el interior duodenal. Según la opinión del servicio de radiodiagnóstico, dichos elementos parecen perdigones de caza. Tras interrogar a la paciente, ésta nos comenta que el día previo a la realización de la prueba había ingerido carne de caza, lo que justificaría el hallazgo.